

Engrapgræs – 2024

| Emne | Tidspunkt | Problem | Løsning | Kommentarer |
|--------------------|-----------------------------|--|---|--|
| Gødskning: | Ultimo feb/starten af marts | | 70-100 kg N/ha | Forårstilførslen afhænger af efterårstilførslen. Op til ca. 180 kg N/ha totalt. N-behovet er størst i plænetyper. Der kan i alt tilføres max. 170 kg N/ha i plænetyper. (Landbrugsstyrelsens N-normer i 2023/24) Tilførsel af P og K er normalt ikke nødvendig, medmindre JB-tallene er lave. Der tilføres 15-20 kg S/ha. |
| Sprøjtning: | Marts | Enårig rapgræs og anden bred forekomst af ukrudt | 2 x 0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Renol eller 2 x 0,07 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Mero 80 EC | Opfølgende behandling på efterårssprøjtningen og evt. nyfremspiring. Behandling bør foretages 1. gang, det er lunt, og enårigt rapgræs skifter til mørkegrøn farve. Hussar OD og Hussar Plus OD er Off-Label godkendt. Halm må <u>ikke</u> anvendes til foder. Vær opmærksom på forårsrestriktionerne, hvis der er brugt Hussar i efteråret. Hussar må ikke anvendes hvis der er anvendt andre SU-midler (Express) i efteråret. Hussar Plus OD må ikke splittes med Hussar OD. DFF kan kombineres med Hussar i den ene af sprøjtningerne. |
| | Ved lidt højere temp | Tokimbladet ukrudt | 0,05-0,1 l/ha Primus eller 0,75-1,0 l/ha Zypar + 0,05-0,075 DFF eller 0,05-0,1 l/ha Primus + 1,25 l/ha Ariane FG S | Zypar og DFF er godkendt til <u>mindre anvendelse</u> og halm må <u>ikke</u> anvendes til foder. (God mod storkenæb og tvetand) |
| | Maj | Vækstregulering | 0,2 l/ha Moddus M | Off-label godkendt. Halm må <u>ikke</u> anvendes til foder ved behandling efter stadie 33. Ønsket opret afgrøde til direkte høst eller lettere skårlægning kan der med fordel vækstreguleres 2 gange. Sidste gang ved fuld gennemskridning. |

| | | | | |
|--|-----|------------------------------------|--|--|
| | Maj | Ved konstateret angreb af skadedyr | 0,2 kg/ha Lamdex | Off-label godkendt. Evt. kan behandlingen gentages 1 gang. Max. 0,6 kg/ha pr. vækstår. Kun i tætte engrapgræsområder. Følg prognosen på landbrugsinfo. Halm må <u>ikke</u> anvendes til foder. |
| | Maj | Svampe | 0,4 l/ha Orius Gold eller 0,5 l/ha Propulse SE 250 | <u>Ved behov.</u> Halm må <u>ikke</u> anvendes til foder Orius Gold: Stadiet 30-55 OBS! omfattet af triazolreglerne med 100% af godkendt dosis for de tidlige stadier (30-39) Propulse SE 250: Stadiet 53-69 |

- Godkendelser til mindre anvendelse kan downloades via link på www.middeldatabasen.dk. Lovlig brug af godkendelser til mindre anvendelse kræver, at du har læst og forstået vejledningen inden du sprøjter. Det er ikke et krav, at vejledningen printes men du skal kunne finde vejledningen hurtigt på PC eller telefon hvis du får kontrolbesøg.
- Læs **altid** etiketten før brug og vær opmærksom på krydsoverensstemmelse, - brug evt. Sprøjtejournalen fra Seges.

Hvis enårig rapgræs optræder som et problem i frømarken, kan en bekæmpelse være aktuel. Hussar har en off-label godkendelse til anvendelse mod enårig rapgræs i rødsvingel. Erfaringer fra tidligere år viser at engrapgræs kan blive "sat" af en behandling, hvis det efterfølgende bliver tørt.

Anvendelse af Hussar OD og Hussar Plus OD mod enårig rapgræs:

Hussar OD og Hussar Plus OD er begge bladmiddler, så det enårige rapgræs skal have grønne blade inden udsprøjtning. Størst effekt af Hussar OD og Hussar Plus OD mod enårig rapgræs opnås ved tidlig sprøjtning og en tør periode efterfølgende. Splitsprøjtning udføres med 2-3 ugers mellemrum. Hvis der er anvendt Hussar OD i efteråret må der ikke anvendes Hussar Plus OD i foråret og hvis der er anvendt Hussar Plus OD i efteråret må der ikke anvendes Hussar OD i foråret. Højeste dosering pr. vækstsæson af Hussar OD er 0,1 l/ha (Ex. 0,02 l/ha efterår + 0,08 l/ha forår) og Hussar Plus OD er 0,14 l/ha (Ex. 0,05 l/ha efterår + 0,09 l/ha forår).

Vigtigt: Husk tilsætning af 0,5 l pr. ha Renol til Hussar OD og 0,5 l pr. ha Mero EC 80 til Hussar Plus OD når de anvendes alene. Sprøjt ikke på stressede planter. Der skal være lunt, over 9 °C, for at få bedst effekt af Hussar og udsigt til 6 timers tørvej efter sprøjtning.

Med venlig hilsen

Barenbrug Danmark ApS