

Strandsvingel – 2024

Emne	Tidspunkt	Problem	Løsning	Kommentarer
Sprøjtning:	Ultimo februar	Enårig rapgræs	0,2 Kerb 400 SC	Den nævnte anvendelse indebærer en risiko for skade på afgrøden. Læs vejledningen grundigt inden brug.
Gødskning:	Primo marts		100-130 kg N/ha	Plænetyper bør i alt tilføres ca. 200 kg N/ha (Landbrugsstyrelsens N-norm i 2023/24). Fodertyper bør ikke tildeles mere end ca. 180 kg N/ha. Der anbefales en svovlholdig gødning, således at der tilføres mindst 15-20 kg S/ha. Tilførsel af P og K er normalt ikke nødvendig, medmindre JB-tallene er lave.
Sprøjtning	Primo april Ved lidt højere temp.	Bred forekomst af ukrudt	0,05-0,125 l/ha Primus eller 0,75-1,0 l/ha Zypar eller 0,6 l/ha Catch + 0,05-0,08 l/ha DFF + spredeklæbemiddel eller 0,1 l/ha Primus + 1,25 l/ha Ariane FG S	Opfølgende behandling på efterårssprøjtning og evt. nyfremspiring. Højeste dosering ved stor ukrudtsmængde og sen behandling. Zypar, Catch og DFF er godkendt til <i>mindre anvendelse</i> og halm må <u>ikke</u> anvendes til foder. (God mod storkenæb og tvetand)
	April	Vindaks, Alm. rapgræs mm.	0,5-0,8 l/ha Primera Super + spredeklæbemiddel	Ved begyndende strækning. <i>Mindre anvendelse</i> godkendelse. Halm må <u>ikke</u> anvendes til foder.
	Maj	Vækstregulering	0,75-1,5 l/ha Medax Top og/eller 1-1,25 l/ha CCC + 0,3-0,4 l/ha Cuadro NT/Moddus S/ Moddus M og/eller 0,4-0,8 l/ha Cuadro NT/Moddus S/ Moddus M	Må ikke anvendes senere end stadie 39. Halmen må <u>ikke</u> opfodres. Pas på under tørre forhold! Reducer evt. dosis, når planterne er stresset. Cycocel må anvendes til stadie 32. Optimal virkning ved 15-20 grader. Vækstreguleret halm må <u>ikke</u> opfodres ved sprøjtning efter stadie 33 med ”moddusprodukter”. ”Moddusprodukter” må anvendes frem til stadie 49.
	Maj - juni	Skadedyr	0,2-0,3 kg/ha Lamdex	<i>Mindre anvendelse</i> godkendelse. Ved behov. Max 0,6 kg/ha/sæson. Behandlet halm må ikke opfodres.

	Maj - juni	Svampe	0,3 l/ha Orius Gold og/eller 0,5 l/ha Propulse ES 250 / Folicur Xpert / Balaya	Ved behov. Anvendes både Balaya, Folicur Xpert og Orius Gold så vær opmærksom på regler omkring maks. dosis for svampemidlerne. Balaya max. 1 gang og ikke senere end 31. Maj. Halm må <u>ikke</u> anvendes til foder.
--	------------	--------	--	---

- Godkendelser til mindre anvendelse kan downloades via link på www.middeldatabasen.dk. Lovlig brug af godkendelser til mindre anvendelse kræver, at du har læst og forstået vejledningen inden du sprøjter. Det er ikke et krav, at vejledningen printes men du skal kunne finde vejledningen hurtigt på PC eller telefon hvis du får kontrolbesøg.
- Læs **altid** etiketten før brug og vær opmærksom på krydsoverensstemmelse, - brug evt. Sprøjtejournalen fra Seges.
- **De angivne doseringer af trinexapac (aktivstof i Moddus/Trimaxx/Cuadro) må ikke overskrides.** Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde. Eksempel: Hvis der ved splitbehandling i frøgræs er anvendt 0,4 L/ha af produkt x svarende til 0,5 N, må der efterfølgende kun anvendes en dosering svarende til 0,5 N af et andet produkt indeholdende trinexapac.
- Der må i samme vækstår ikke også anvendes andre svampemidler, der indeholder tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier, jf. brugsanvisningerne. Dette bevirker, at de tidlige behandlinger med Orius Gold & Folicur Xpert, påvirker triazolregnskabet kraftigt. Tag gerne kontakt til din frøavlskonsulent for at lave den rigtige plan for svampebekæmpelse i frøafgrøderne.

Med venlig hilsen

Barenbrug Danmark ApS